

Rektum Kanseri Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım

Doç. Dr. Wafi Attaallah

EBSQ Coloproctology

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Olgu Sunumu

- **Hasta Adı, Soyadı :** H Y
- **Yaş :** 67
- **Cinsiyet :** Kadın
- **Boy / Ağırlık / BMI:** 151 cm 73 kg/ 32


- **Yakınma:** Kabızlık, şişkinlik, kilo kaybı
- **ÖYKÜ:** Yaklaşık bir yıldır kabızlık ve gaz çıkaramama, şişkinlik şikayetiyle dış merkeze başvuran hastanın son altı ayda yaklaşık 20kg kaybı mevcut.

- **Özgeçmiş:** DM
- **Operasyonlar :** 2015 Katarakt opere
- **Soygeçmiş :** Özellik yok
- **İlaçlar :** Lantus 10Ü 1x1 Apidra 6Ü 3x1
- **Alışkanlıklar :** Özellik yok
- **Allerji :** Bilinen yok
- **RT:** Tuşede anal girimden yaklaşık 5.cmde ele gelen kitle mevcut.


- **09.06.2020 Kolonoskopi:** Çekuma kadar gidildi. Rektumda 5.cmden 10.cme uzanan, lümeneye protrüde kitle görüldü.
- Bx alındı: Adenokarsinom


08.07.2020 Abdomen BT: Rektumda 6cmlik segmentte 1,5 cm ölçülen
kitleesel duvar kalınlaşması mevcut.

e - Öğrenme





- **07.07.20 Abdomen MR:** Rektumda 6cmlik segmentte 1,5 cm ölçülen kitlesel duvar kalınlaşması mevcut.
- Perirektal yağlı planlarda çok sayıda lenf nodu izlendi.






- Hasta 28 gün RT + Kapeda tedavisi almış.
- Son kürü Eylül sonunda almış.
- 13.11.2020 MR de: Rektumda yaklaşık 4 cm' lik segmentte sağ posterolateralde 18 mm kalınlık artışı izlendi.
- Tarif edilen kitle lezyon perirektal yağlı planlaraspiküler uzanım göstermekte olup en büyüğünün kısa aksı 8 mm ölçülen reyonel lenf nodları izlendi.
- Presakral yumuşak dokularda en kalın yerinde 14 mm ölçülen kalınlık artışı izlendi.







Yapılan Ameliyat


- Tarih : 10/12/2020 – Elektif, açık cerrahi ile very low anterior rezeksiyon + ILS 31 ile anostomoz + **tüp ileostomi:**


A new technique of completely diverted tube ileostomy for the protection of colorectal anastomosis: a pilot study

W. Attaallah , A. Bulut , T. K. Uprak  and C. Yegen 


Department of General Surgery, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Received 20 March 2019; accepted 30 September 2019; Accepted Article online 26 October 2019






A



B



C



D




E



- Postoperatif 1 günde rejim 1 , postop 2. günde rejim 2 başlandı.
- Takipte hasta stabildi, oral rejimi rahat tolere etti.
- 17/12/20 rektoskopide anastomoz intakt görülmesi üzerine penröz dren çekildi.



- Hasta önerilerle taburcu edildi.
- 24.12.2020 de ileostomi tüpü çekildi.
- 1 hafta sonra tüp yeri tamamen kapanmış



Patoloji sonucu

- Adenokarsinom
- Malignite negatif 15 adet lenf nodu
- Cerrahi sınırlarlarda tümör görülmedi.
- AJCC-2017: ypT2N0
- Lenfovasküler invazyon:+
- Perinöral invazyon:+
- Neo-adjuvan tedavi etkisi: orta derecede